

سانوفي الجزائر ينظم الطبعة السادسة للملتقى الوطني حول أمراض القلب و الأوعية الدموية و داء السكري

الجزائر العاصمة (الجزائر) 16 فبراير 2020- جمع سانوفي الجزائر الخبراء و المهنيين بمناسبة الطبعة السادسة للملتقى الوطني حول أمراض القلب و الأوعية الدموية و داء السكري. وشكلت هذه الطبعة السادسة -التي نظمت يوم 13 فبراير بالمركز الدولي للمؤتمرات بالجزائر العاصمة - فرصة للخبراء و المهنيين للتبادل حول آخر التطورات العلمية و الوبائية التي تخص هذه الأمراض المزمنة.

و قدمت خلال هذا الملتقى العلمي نتائج دراستين رصديتين : دراسة "ADHERE" حول داء السكري و دراسة "INITIATION" حول ارتفاع الضغط الدموي. وقاد خبراء و علماء جزائريين هاتين الدراستين التي بادرت بها سانوفي الجزائر.

و صرح المدير العام لسانوفي الجزائر، السيد رأفت حنين خلال افتتاح الملتقى :

"تندرج هذه الطبعة السادسة ضمن التزامنا في الجزائر كما تجسد إرادتنا في تقوية مساهمتنا و شراكتنا مع جميع فاعلي الصحة في الجزائر لنواجه معا التحديات الكبرى للقطاع. و ترافق سانوفي منذ ثلاثين سنة فاعلي قطاع الصحة في الجزائر وهذا عبر الإعلام و التكوين و التحسيس للتشخيص المبكر وكذلك من خلال الإنتاج الوطني و الشراكات ذي المستوى العالي في مختلف المجالات على سبيل مثال دراسة "INITIATION" في مجال ارتفاع الضغط الدموي و دراسة "ADHERE" في مجال داء السكري اللتان تعززان مكانة الجزائر في الدراسات الطبية".

دراسة "INITIATION" هي أول دراسة وصفية طولية حول تسيير مرض ارتفاع الضغط الدموي في الجزائر. وشملت الدراسة 611 مريضا موزعين على 51 موقع عبر الوطن حيث مكنت من تقييم -في الممارسة الطبية المعتادة- مراقبة الضغط الدموي خلال 6 الى 12 شهرا من متابعة مرضى مصابين بارتفاع الضغط الدموي و الذين تم تشخيص مرضهم حديثا وعلاجهم لأول مرة. و بينت الدراسة أن % 66,7 و % 74,6 من المرضى بلغوا الضغط الدموي المراد مراقبته خلال ال6 و ال12 شهرا على التوالي بنسبة تقدر ب% 17,1 في 6 أشهر من المتابعة و% 15,3 في 12 شهرا.

دراسة "ADHERE" شملت 575 مريضا موزعين على 52 موقع عبر الوطن. و كان هدف الدراسة تقييم الممارسة الطبية عند المصابين بداء السكري صنف 2 و الذين يعالجون بالأنسولين البطيئ وكذلك اصرار و التصاق الأنسولين البطيئ بعد 12 من العلاج هدف تشخيص العوامل التنبؤية لهاتين الظاهرتين. و بينت الدراسة أن % 25,4 فقط من المرضى يحققون هدف نسبة السكر في الدم ($d'HbA1c > 7\%$) بعد 12 شهرا من المراقبة بينما حققت في نفس المدة نسب جد مرضية في ما يخص الإصرار (% 91,9) و الالتصاق الجيد عند % 82,4 من المرضى. وهذا يعني أن غالبية المرضى لا يتوقفون عن تناول الأنسولين البطيئ بعد 12 شهر و بالتصاق جيد. و رغم هذا، يبقى تحسين مراقبة نسبة السكر في الدم الوسيلة لتحقيق الأهداف العلاجية . أما العوامل التي تؤثر في الإصرار الجيد هي : قدم الإصابة بداء السكري و نوع الأنسولين و التربية العلاجية كما يؤثر العاملين الأخيرين في الالتصاق الجيد.

انتهى

سانوفي في الجزائر

سانوفي شريك في مسار الرعاية الصحية للمرضى الجزائريين منذ حوالي 30 عامًا، موظفا أكثر من 900 عامل في الجزائر. نحن ملتزمون مع جميع الجهات الفاعلة في مجال الصحة من خلال شراكات رفيعة المستوى في العديد من المجالات: توفير الحلول الصحية والوقاية وتشجيع البحث والتعليم الطبي المستمر وادماجها في الصناعة. توفر سانوفي للمرضى الجزائريين منتجات مبتكرة في أكثر من 135 تخصصًا مختلفًا منها مرض السكري وارتفاع ضغط الدم وأمراض القلب والأورام والتخثر وطب النفس والأعصاب والطب العام وكذلك في مجال اللقاحات من خلال سانوفي باستور والأمراض النادرة من خلال سانوفي جانزيم.

نبذة عن سانوفي
مهمتنا هي مرافقة أولئك الذين يواجهون مشاكل صحية. بصفتنا شركة صيدلانية حيوية عالمية متخصصة في صحة الإنسان ، فإننا نقاوم الأمراض من خلال لقاحاتنا و بتقديم علاجات بتكرة. مرافقتنا تخص المصابين القلائل بالأمراض النادرة بنفس مستوى الأهمية كملايين المصابين بالأمراض المزمنة. تعمل سانوفي وموظفوها الذين يزيد عددهم على 100000 موظف في 100 دولة على تحويل الابتكار العلمي إلى حلول حقيقية للرعاية الصحية في جميع أنحاء العالم.
سانوفي، الحياة بكل قوتها.

للاتصال بالإعلام عند سانوفي

ريم فتوش

مديرة الإعلام و الإتصال

Tel : 0982400220

Rym.Fettouhe@sanofi.com