

RENSEIGNEMENTS POUR LE CONSOmmATEUR

RESONIUM CALCIUM®
(sulfonate de polystyrène calcique)

Le présent dépliant est conçu spécialement à l'attention des consommateurs. Ce dépliant est un résumé et ne contient pas tous les renseignements relatifs à RESONIUM CALCIUM. Communiquez avec votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si vous avez des questions à propos de ce médicament.

AU SUJET DE CE MÉDICAMENT

Les raisons d'utiliser ce médicament :

RESONIUM CALCIUM est utilisé pour retirer les quantités élevées de potassium du sang.

Les effets de ce médicament :

RESONIUM CALCIUM se lie aux quantités excessives de potassium dans le corps, notamment dans le gros intestin, afin de permettre leur élimination de l'organisme par les selles.

Les circonstances où il est déconseillé d'utiliser ce médicament

Ne prenez pas RESONIUM CALCIUM si :

- Vous souffrez d'une obstruction intestinale (intestin bloqué).
- Vous souffrez d'une condition médicale comme des problèmes de thyroïde ou certains types de cancer qui se traduisent par des niveaux élevés de calcium dans le sang.
- Vous avez un faible taux de potassium dans votre sang.
- Vous êtes allergique au sulfonate de polystyrène calcique ou à l'un des ingrédients contenus dans le produit (voir la section « Les ingrédients non médicinaux sont »).

Ne donnez pas RESONIUM CALCIUM par voie orale à un nouveau-né. RESONIUM CALCIUM ne doit être administré que par voie rectale chez le nouveau-né.

N'utilisez pas RESONIUM CALCIUM chez le nouveau-né présentant un ralentissement du transit intestinal (à cause d'autres médicaments ou à la suite d'une chirurgie).

L'ingrédient médicinal est :

Sulfonate de polystyrène calcique

Les ingrédients non médicinaux sont :

Saccharine, vanilline

Les formes posologiques sont :

Poudre

MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS

AVANT d'utiliser RESONIUM CALCIUM, parlez à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si vous souffrez ou avez souffert de problèmes médicaux, en particulier si :

- Vous souffrez de problèmes intestinaux ou de constipation.
- Vous souffrez de troubles rénaux.
- Vous souffrez de graves brûlures.
- Vous prenez des médicaments qui suppriment votre système immunitaire.
- Vous avez des problèmes cardiaques et prenez de la digitale.
- Vous avez un faible volume sanguin, ce qui peut se produire suite à une déshydratation ou des saignements.
- Vous souffrez d'un déséquilibre électrolytique, car le traitement par RESONIUM CALCIUM peut aggraver ces déséquilibres; votre médecin pourrait vouloir vérifier les taux d'électrolytes dans votre sang plus souvent au cours du traitement.
- Vous souffrez de problèmes respiratoires, aux poumons ou à la poitrine, car l'inhalation accidentelle du médicament peut causer une bronchite et/ou une pneumonie aiguë; la prudence est de mise afin de ne pas inhaler le médicament quand celui-ci est ingéré.
- Vous êtes enceinte ou prévoyez le devenir.
- Vous allaitez, car on ne sait pas si RESONIUM CALCIUM se retrouve dans le lait maternel.

Si vous prenez RESONIUM CALCIUM par voie orale, ne le prenez pas en même temps qu'un autre médicament à prise orale (voir la section « UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT »).

Les laxatifs contenant du magnésium ne doivent pas être utilisés avec RESONIUM CALCIUM.

INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES

Comme c'est le cas avec la plupart des médicaments, des interactions avec d'autres médicaments sont possibles. Mentionnez à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien tous les médicaments que vous prenez, y compris les médicaments prescrits par d'autres médecins, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les médecines douces (sans ordonnance ou en vente libre).

S'il est administré par voie orale, RESONIUM CALCIUM peut nuire à l'absorption d'autres médicaments à prise orale (voir la section « UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT »).

Les produits qui suivent peuvent interagir avec RESONIUM CALCIUM :

- La digoxine, un médicament utilisé pour traiter des problèmes cardiaques.
- Les laxatifs comme l'hydroxyde de magnésium ou le carbonate d'aluminium.
- La thyroxine, un médicament utilisé pour traiter l'hypothyroïdie.
- Le lithium, un médicament qui peut être utilisé pour traiter un trouble bipolaire.
- Les antiacides contenant de l'aluminium ou du magnésium.
- Le sorbitol (un édulcorant « sans sucre » utilisé pour sucrer les aliments).

UTILISATION APPROPRIÉE DE CE MÉDICAMENT

Dose habituelle :

RESONIUM CALCIUM peut être administré par voie orale ou dans le rectum.

La quantité de RESONIUM CALCIUM que vous devez prendre dépend de la quantité de potassium contenue dans votre sang.

Votre médecin vérifiera régulièrement les taux de potassium, de calcium et de magnésium dans votre sang. Le médecin peut modifier votre dose ou interrompre la prise de RESONIUM CALCIUM en fonction des résultats de ces tests sanguins.

Votre médecin établira la quantité exacte de RESONIUM CALCIUM que vous devez prendre. Les doses habituelles sont les suivantes :

ADMINISTRATION ORALE

S'il est administré par voie orale, RESONIUM CALCIUM doit être pris au moins 3 heures avant ou 3 heures après tout autre médicament à prise orale. Si vous souffrez de gastroparésie (un trouble empêchant l'estomac de se vider normalement), il faut envisager de séparer la prise des médicaments de 6 heures. Demandez conseil à votre professionnel de la santé à ce sujet (voir les sections « MISES EN GARDE ET PRÉCAUTIONS et « INTERACTIONS MÉDICAMENTEUSES »).

La poudre de RESONIUM CALCIUM est généralement administrée par voie orale, mélangée à une petite quantité d'eau. Elle peut également être mélangée avec de la nourriture ou sucrée. Ne mélangez PAS RESONIUM CALCIUM avec du jus d'orange ou un jus de fruits qui contient du potassium. RESONIUM CALCIUM est une poudre. Veillez à ne pas l'inhaler accidentellement. L'inhalation de la poudre peut causer une toux et un essoufflement.

Adultes, incluant les personnes âgées :

15 g de trois à quatre fois par jour comme cela est indiqué ci-dessus. La cuillère fournie dans le pot contient 15 g de poudre quand elle est remplie à ras bord.

Enfants :

Vous devez suivre la posologie recommandée par votre médecin.

Pour les enfants, RESONIUM CALCIUM est de préférence donné avec une boisson (PAS un jus de fruits en raison de la forte teneur en potassium de ce type de boisson) ou encore un peu de confiture ou de miel.

Nouveau-nés (nourrissons)

RESONIUM CALCIUM ne doit pas être administré par voie orale.

ADMINISTRATION RECTALE

Le lavement est généralement administré par un médecin ou une infirmière.

Adultes :

Le lavement devrait être préparé par le pharmacien ou l'infirmière. Si possible, le lavement devrait être conservé dans le rectum pendant au moins neuf heures. Le côlon doit ensuite être rincé pour en retirer RESONIUM CALCIUM.

Enfants et nouveau-nés (nourrissons) :

Le lavement devrait être préparé par le pharmacien ou l'infirmière. Le lavement devrait être conservé dans le rectum aussi longtemps que possible. Le côlon doit ensuite être rincé pour en retirer RESONIUM CALCIUM.

Surdose :

Prendre trop de RESONIUM CALCIUM peut abaisser votre taux de potassium sanguin sous le taux normal. Si vous en prenez trop, vous pourriez vous sentir irritable et confus, souffrir d'une faiblesse musculaire, avoir des réflexes diminués ou souffrir d'une paralysie.

En case de surdosage, communiquez immédiatement avec un professionnel de la santé, l'urgence d'un centre hospitalier ou le centre antipoison de votre région, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Ne prenez pas une double dose pour compenser celle que vous avez oubliée. S'il est presque temps de prendre la dose suivante, sautez la dose oubliée et prenez la prochaine dose selon l'horaire normal.

PROCÉDURES À SUIVRE EN CE QUI CONCERNE LES EFFETS SECONDAIRES

Les effets secondaires peuvent inclure :

- Nausées et vomissements
- Diarrhée
- Perte d'appétit

Mentionnez-le à votre médecin, votre infirmière ou votre pharmacien si un ou plusieurs de ces effets vous touchent gravement.

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Douleurs abdominales (douleur au niveau de l'estomac et du rectum)			x
Réaction allergique (éruption cutanée, démangeaisons, enflure du visage, de la langue et de la gorge, graves étourdissements et difficulté à respirer)			x
Constipation (ballonnement et gonflement de l'abdomen)			x
Irritation et saignements au niveau de l'estomac (vomissements qui ressemblent à du marc de café)			x
Saignement rectal (selles sanglantes, noires ou goudronneuses)			x
Haut taux de calcium (nausées, constipation, perte d'appétit, confusion, perte de mémoire)		x	

EFFETS SECONDAIRES GRAVES : FRÉQUENCE ET PROCÉDURES À SUIVRE

Symptôme / effet	Consultez votre médecin ou votre pharmacien		Cessez de prendre le médicament et téléphonez à votre médecin ou à votre pharmacien
	Seulement pour les effets secondaires graves	Dans tous les cas	
Faible taux de potassium (crampes musculaires, sentiment de fatigue, confusion, faiblesse musculaire ou modification du rythme cardiaque)		x	
Faible taux de magnésium (mouvements oculaires anormaux, crises convulsives, sensation de fatigue, spasmes ou crampes musculaires, faiblesse musculaire, engourdissement)		x	
Impaction fécale (une masse de selles dures causant la fuite de selles liquides, des douleurs à l'estomac, une impression d'avoir besoin de pousser, des nausées, des vomissements et une perte d'appétit) après une administration rectale, en particulier chez les enfants			x
Obstruction intestinale (crampes, graves douleurs à l'estomac, vomissements, ballonnements, constipation, incapacité à évacuer les gaz)			x
Perforation intestinale (graves douleurs à l'estomac, frissons, fièvre, nausées et vomissements)			x

Cette liste d'effets secondaires n'est pas exhaustive. Pour tout effet inattendu ressenti lors de la prise de RESONIUM CALCIUM, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre pharmacien.

COMMENT CONSERVER LE MÉDICAMENT

Conserver à la température ambiante (entre 15 et 30 °C).
Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Déclaration des effets secondaires

Vous pouvez signaler les effets secondaires soupçonnés d'être associés avec l'utilisation d'un produit de santé à Santé Canada :

- en visitant le site Web des déclarations des effets indésirables (<https://www.canada.ca/fr/sante-canada/services/medicaments-produits-sante/medeffet-canada/declaration-effets-indesirables.html>) pour savoir comment faire une déclaration en ligne, par courrier ou par télécopieur; ou
- en composant le numéro sans frais 1-866-234-2345.

REMARQUE : Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. Le Programme Canada Vigilance ne donne pas de conseils médicaux.

POUR DE PLUS AMPLES RENSEIGNEMENTS

On peut trouver ce document et la monographie complète du produit, rédigés pour les professionnels de la santé, à l'adresse suivante : www.sanofi.ca ou en communiquant avec le promoteur, sanofi-aventis Canada Inc., au : 1-800-265-7927

sanofi-aventis Canada Inc. a rédigé ce dépliant.

Dernière révision : 19 septembre 2018