

RENSEIGNEMENTS SUR LE MÉDICAMENT POUR LE PATIENT

LISEZ CE DOCUMENT POUR ASSURER UNE UTILISATION SÉCURITAIRE ET EFFICACE DE VOTRE MÉDICAMENT

MenQuadfi^{MC}

Vaccin polysaccharidique contre le méningocoque (groupes A, C, Y et W) conjugué à l'anatoxine tétanique

Lisez ce qui suit attentivement document avant que vous ou votre enfant receviez **MenQuadfi**. L'information présentée ici est un résumé et ne couvre pas tout ce qui a trait à ce médicament. Parlez de votre état de santé et de votre traitement à votre professionnel de la santé et demandez-lui s'il possède de nouveaux renseignements au sujet de **MenQuadfi**.

Pourquoi MenQuadfi est-il utilisé?

MenQuadfi est un vaccin. Il sert à vous aider à vous protéger, vous ou vos enfants, contre les infections causées par des bactéries (germes) appelées « *Neisseria meningitidis* » des types A, C, Y et W. *Neisseria meningitidis* se transmet d'une personne à une autre et peut causer une méningite (inflammation des tissus qui entourent le cerveau et la moelle épinière) ou une septicémie (infection du sang). Ces deux maladies peuvent être graves et laisser des séquelles permanentes ou entraîner la mort. MenQuadfi ne protège pas contre les maladies causées par d'autres agents infectieux.

Comment MenQuadfi agit-il?

MenQuadfi stimule le corps à fabriquer ses propres moyens de protection naturelle contre les bactéries qui causent de la méningococcie (due aux types A, C, Y et W de *Neisseria meningitidis*). Après l'administration du vaccin, le corps commence à produire des substances, appelées *anticorps*, qui l'aident à combattre cette infection. Si une personne vaccinée entre en contact avec l'un des germes qui causent cette maladie, son corps est habituellement prêt à les détruire. Le temps que met le corps à produire assez d'anticorps pour se protéger contre la méningococcie est variable, et il peut être de quelques semaines après la vaccination.

La vaste majorité des personnes vaccinées avec MenQuadfi produiront assez d'anticorps pour être protégées de la méningococcie (due aux types A, C, Y et W). Toutefois, comme avec tous les vaccins, aucune protection à 100 % ne peut être garantie.

Quels sont les ingrédients de MenQuadfi?

Ingrédients médicinaux : polysaccharides de méningocoque (des groupes A, C, Y et W) conjugués à la protéine anatoxine tétanique.

Ingrédients non médicinaux : acétate de sodium à 50 mM et de pH 6,0, chlorure de sodium, eau stérile pour injection.

Sous quelles formes se présente MenQuadfi?

MenQuadfi est un vaccin liquide limpide et incolore qui est injecté dans un muscle. Chaque dose est de 0,5 mL.

Ne recevez pas MenQuadfi si vous ou votre enfant :

- êtes allergique à l'une des substances actives ou à l'un des autres ingrédients de MenQuadfi. Les symptômes d'allergie peuvent comprendre une éruption cutanée, des démangeaisons, des difficultés à respirer, un essoufflement ou une enflure du visage, des lèvres, de la gorge ou de la langue. Si vous n'êtes pas sûr d'être allergique ou non, parlez à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière avant de recevoir MenQuadfi.
- avez des antécédents connus de syndrome de Guillain-Barré, à moins que les bienfaits attendus l'emportent sur le risque lié à la vaccination.

Consultez votre professionnel de la santé avant de recevoir ou avant que votre enfant ne reçoive MenQuadfi, afin de réduire la possibilité d'effets indésirables et pour assurer la bonne utilisation du médicament. Mentionnez à votre professionnel de la santé tous vos problèmes de santé ou ceux de votre enfant, notamment si vous ou votre enfant :

- vous êtes déjà évanoui en recevant une injection. Certaines personnes (surtout des adolescents et de jeunes adultes) peuvent s'évanouir et parfois faire une chute après ou même avant de recevoir une injection avec une aiguille;
- avez une maladie qui affaiblit les défenses naturelles de votre corps (votre système immunitaire). Votre réponse aux vaccins pourrait alors ne pas être optimale;
- êtes atteint de thrombocytopénie ou d'un trouble de la coagulation, ou recevez des anticoagulants;
- faites de la fièvre (plus de 38 °C). Il n'est pas nécessaire de reporter la vaccination si vous ou votre enfant souffrez d'une infection sans gravité comme le rhume, mais parlez-en à votre médecin, à votre pharmacien ou à votre infirmière avant de recevoir MenQuadfi;
- êtes enceinte et/ou allaitez.

Mentionnez à votre professionnel de la santé toute la médication que vous ou votre enfant prenez, y compris les médicaments, les vitamines, les minéraux, les suppléments naturels ou les produits les médicaments alternatifs.

MenQuadfi pourrait ne pas avoir un effet optimal s'il est utilisé avec des médicaments qui affaiblissent le système immunitaire, comme des corticostéroïdes à fortes doses ou des agents de chimiothérapie.

Comment utiliser MenQuadfi :

MenQuadfi est administré par un médecin, un pharmacien ou une infirmière, par injection de 0,5 mL dans le muscle du haut du bras ou dans la cuisse, selon votre âge et votre masse musculaire.

Dose habituelle :

Chaque dose est de 0,5 mL.

Surdosage :

Si vous pensez que vous ou une personne dont vous vous occupez avez reçu trop de MenQuadfi, contactez immédiatement avec un professionnel de la santé, le service des urgences d'un hôpital ou votre centre antipoison régional, même en l'absence de symptômes.

Dose oubliée :

Sans objet pour ce vaccin.

Quels sont les effets secondaires possibles de l'emploi de MenQuadfi?

Comme tous les médicaments, ce vaccin peut causer des effets secondaires, mais pas nécessairement chez tous les patients. En recevant MenQuadfi, vous ou votre enfant pourriez ressentir d'autres effets secondaires que ceux qui sont mentionnés ci-dessous. Si c'est le cas, communiquez avec votre professionnel de la santé.

Les effets secondaires suivants peuvent être observés après l'administration de MenQuadfi aux enfants de 12 à 23 mois.

Très courants (pouvant toucher plus de 1 personne sur 10)

- Sensibilité, rougeur ou enflure au point d'injection
- Irritabilité
- Pleurs
- Perte d'appétit
- Somnolence

Courants (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- Fièvre
- Vomissements
- Diarrhée

Les effets secondaires suivants peuvent être observés après l'administration de MenQuadfi aux enfants (âgés d'au moins 2 ans), aux adolescents, aux adultes et aux personnes âgées.

Très courants (pouvant toucher plus de 1 personne sur 10)

- Douleur au point d'injection
- Douleur musculaire
- Maux de tête
- Sensation de malaise général

Courants (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 10)

- Rougeur ou enflure au point d'injection
- Fièvre

Peu courants (pouvant toucher jusqu'à 1 personne sur 100)

- Démangeaisons, sensation de chaleur, ecchymoses (bleus) ou éruption cutanée au point d'injection
- Vomissements
- Étourdissements
- Nausées

- Fatigue

Les effets secondaires suivants peuvent survenir dans n'importe quel groupe d'âge.

Inconnue (les données disponibles ne permettent pas d'estimer la fréquence)

- Hypersensibilité, y compris anaphylaxie
- Crises (convulsions) avec ou sans fièvre

Consultez votre professionnel de la santé si vous éprouvez des symptômes ou des effets indésirables incommodes qui ne sont pas énumérés ci-dessus ou qui s'aggravent au point de nuire à vos activités quotidiennes.

Déclaration des effets secondaires soupçonnés d'être liés à la vaccination

À l'intention du grand public : Si vous ou votre enfant ressentez un effet secondaire après l'immunisation, veuillez le signaler à votre professionnel de la santé.

Consultez votre professionnel de la santé si vous avez besoin de renseignements sur le traitement des effets secondaires. L'Agence de la santé publique du Canada, Santé Canada et Sanofi-Pasteur ne peuvent pas fournir de conseils médicaux.

À l'intention des professionnels de la santé : Si un patient ressent un effet secondaire à la suite d'une vaccination, veuillez remplir le formulaire approprié de rapport des effets secondaires suivant l'immunisation (ESSI) selon votre province ou territoire (<https://www.canada.ca/fr/sante-publique/services/immunisation/declaration-manifestations-cliniques-inhabituelles-suite-immunisation/formulaire.html>) et l'envoyer à votre unité de santé locale.

Entreposage :

Conserver au réfrigérateur (à une température de 2° à 8° °C).

Ne pas congeler.

Garder hors de la portée et de la vue des enfants.

Pour en savoir davantage au sujet de MenQuadfi :

- Communiquez avec votre professionnel de la santé.
- Lire la monographie de produit intégrale rédigée à l'intention des professionnels de la santé, qui renferme également les renseignements sur le médicament pour le patient. Ce document est disponible sur le [site Web de Santé Canada](#), le site Web du fabricant, www.sanofi.com/fr/canada, ou peut être obtenu en téléphonant au 1 888 621-1146 (sans frais).

Le présent dépliant a été rédigé par Sanofi Pasteur Limited.

Dernière révision : 21 août 2024