



Léčivé přípravky
s obsahem teriflunomidu

Předložte tuto kartu každému lékaři nebo zdravotnickému
pracovníkovi, který Vám bude poskytovat lékařskou péči
(např. při návštěvě pohotovosti).

Obecné pokyny



Tato Karta pacienta obsahuje důležité bezpečnostní informace,
které musíte znát, pokud se léčíte přípravkem s obsahem teriflunomidu.
Úplné informace naleznete v balení léčivého přípravku.

KARTA PACIENTA LÉČENÉHO TERIFLUNOMIDEM

Jméno pacienta: _____

Datum prvního předepsání
přípravku s obsahem teriflunomidu: _____

Název léčivého přípravku: _____

Název centra: _____

Jméno ošetřujícího lékaře: _____

Telefonní číslo ošetřujícího lékaře: _____

Léčivé přípravky s obsahem teriflunomidu

Schváleno SÚKL: 09/2023
Verze: 2.0





Důležité nežádoucí účinky

Tento lék může ovlivnit funkci jater, krevní tlak a určité buňky v krvi, které jsou důležité pro boj s infekcemi.

Pokud se u Vás vyskytne některý z níže uvedených nežádoucích účinků, okamžitě kontaktujte svého lékaře:

- Zežloutnutí kůže nebo očí, tmavá moč, nevolnost nebo zvracení a bolest břicha. V takovém případě můžete mít problémy s játry.
- Vysoká teplota (horečka), kašel, zimnice, otoky uzlin, bolestivé močení nebo snížený proud moči nebo zmatenost. V takovém případě můžete mít infekční onemocnění.

Tento přehled nežádoucích účinků není úplný a je třeba se seznámit i s možnými dalšími nežádoucími účinky, jejichž výčet naleznete v Příbalové informaci pro pacienta. Příbalová informace pro pacienta (PIL) je distribuována v každém balení léčivého přípravku a lze ji také vyhledat na <http://www.olecich.cz//> po zadání názvu léčivého přípravku pod zkratkou PIL.



Pro ženy, které by mohly otěhotnět, včetně dívek a jejich rodičů / zákonných zástupců

- Nezačínajte léčbu přípravkem s obsahem teriflunomidu, pokud jste těhotná nebo se domníváte, že můžete být těhotná. Lékař Vás může vyzvat, abyste pro ověření podstoupila těhotenský test.
 - Během léčby přípravkem s obsahem teriflunomidu a po jeho použití používejte spolehlivou a účinnou metodu antikoncepce. Lékař Vás bude informovat o možných rizicích pro plod a o potřebě účinné antikoncepce.
- Kontaktujte svého lékaře, jestliže chcete změnit antikoncepční metodu nebo chcete otěhotnět.
 - Pokud otěhotníte nebo se budete domnívat, že jste těhotná, zastavte užívání přípravku s obsahem teriflunomidu a **kontaktujte ihned svého lékaře**.
 - V případě těhotenství může lékař navrhnout léčbu určitými léky, které umožní přípravek s obsahem teriflunomidu rychle a dostatečně odstranit z Vašeho těla.
 - Poradte se také se svým lékařem, pokud plánujete kojení nebo kojíte.

Pro rodiče / zákonné zástupce nebo dívky: kontaktujte svého lékaře, POKUD SE U PACIENTKY POPRVÉ OBJEVÍ MENSTRUACE, abyste získali rady, týkající se možného rizika pro plod a potřeby antikoncepce.

Pokud se u Vás vyskytne kterýkoli z nežádoucích účinků, sdělte to svému lékaři nebo lékárníkovi. Stejně postupujte i v případě jakýchkoli nežádoucích účinků, které nejsou uvedeny v příbalové informaci. Nežádoucí účinky můžete hlásit také přímo prostřednictvím národního systému hlášení nežádoucích účinků.

Podrobnosti o hlášení najdete na:

www.olecich.cz/hlaseni-pro-sukl/nahlasit-nezadouci-ucine

Adresa pro zasílání je Státní ústav pro kontrolu léčiv, oddělení farmakovigilance, Šrobárova 48, Praha 10, 100 41, e-mail: farmakovigilance@sukl.cz.

Nahlášením nežádoucích účinků můžete přispět k získání více informací o bezpečnosti tohoto přípravku.

Tato informace může být také hlášena držitelům rozhodnutí o registraci.

