

			MS-sygeplejerske
			Egen læge
			Neurolog
		Navn	
		Telefonnummer	
		E-mail	

Date for sidste LEMTRADA infusion:.....

Patientens underskrift:.....

Patientens navn:.....

Min neurolog, der har ordineret LEMTRADA, kan kontaktes på nedenstående telefonnummer eller e-mail. Også andre læger eller sundhedspersonale, som er involveret i min behandling, kan være angivet.

Hvis der foretages undersøgelse, bedes kopier af alle journaler (herunder eventuelle handlinger og/eller prøveresultater) tilsendes nedenstående læger/neurologer.

PATIENTKORT

Du skal altid have dette patientkort på dig og vise det til læger, skadestuepersonale og andre sundhedspersoner, så de kender til din behandling med LEMTRADA.

Jeg er blevet behandlet med LEMTRADA for multipel sclerose (MS). Behandlingen påvirker immunsystemet. Jeg deltager i et særligt overvågningsprogram, der fortsætter som minimum hver måned i 4 år efter min sidste behandling.

LEMTRADA behandling kan øge risikoen for:

- Alvorlige infektioner
- Alvorlige bivirkninger, der som oftest kan opstå 1-3 dage efter LEMTRADA infusion: hjerteanfald, slagtilfælde /apopleksi, rifter (dissektion) i de blodkar, der forsyner hjernen med blod, blødning i lungerne og nedsat antal blodplader
- Forsinkede bivirkninger: sygdomme i skjoldbruskkirtlen, ITP, nyreproblemer, autoimmun hepatitis, HLH, erhvervet hæmofili A, TTP, AOSD og AIE

Til lægen: Se LEMTRADA produktresumé (SmPC) for flere oplysninger

Det er meget vigtigt, at du fortsætter med at få foretaget dine månedlige prøver i mindst 48 måneder (4 år) efter din sidste infusion (også selvom du har det godt).

Der kan opstå forsinkede bivirkninger efter de 48 måneder. Derfor skal du også fortsætte med at holde øje med tegn og symptomer, selv efter de månedlige prøver ikke længere er nødvendige.



Tidlig opdagelse og diagnosticering giver de bedste muligheder for bedring



Du skal også fortsætte med at holde øje med tegn og symptomer



Det skal du gøre i mindst 48 måneder efter dit sidste behandlingsforløb med LEMTRADA

Det bør du vide om LEMTRADA® (alemtuzumab)

Du skal straks ringe til din neurolog, hvis du får følgende symptomer - uanset om de lige er opstået, er blevet forværret eller er vendt tilbage. Søg straks lægehjælp, hvis du ikke kan få fat i din neurolog og husk at vise dit patientkort.

VIGTIGE BIVIRKNINGER DU SKAL HOLDE ØJE MED:

Alvorlige infektioner

- Feber, kulderystelser, træthed, åndenød, hoste, hvæsende vejrtrækning, brystmerter eller trykken for brystet og hoste med blod

Sjælden hjerneinfektion kaldet PML (progressiv multifokal leukoencefalopati)

- Tiltagende svaghedsfølelse eller klodsethed
- Synsforstyrrelser, talebesvær
- Ændret tankevirksomhed, hukommelse og orienteringsevne, der kan medføre forvirring og ændret personlighed

Alvorlige bivirkninger, der kan opstå kort tid efter LEMTRADA infusion (som regel 1-3 dage efter infusion)

Hjerteanfald

- Brystmerter eller ubehag i brystet, åndenød, smerter eller ubehag i arme, kæben, nakke, ryg eller mave
- Svimmelhed eller følelse af at være uklar, kvalme, svedudbrud

Slagtilfælde / apopleksi eller rifter (dissektion) i de blodkar, der forsyner hjernen med blod

- Pludseligt hængende ansigtsmuskler i den ene side af ansigtet, svaghedsfølelse i den ene side af kroppen, talebesvær
- Pludselig kraftig hovedpine, nakkesmerter

Blødning i lungerne

- Åndenød, brystmerter eller ubehag i brystet, hoste med blod

Nedsat antal blodplader (trombocytopeni)

- Tendens til blå mærker/blødning

Forsinkede bivirkninger (kan opstå måneder til år efter infusion)

Sygdomme i skjoldbruskkirtlen

- Overaktiv skjoldbruskkirtel (hyperthyreose)
 - Kraftig svedtendens, uforklarligt vægttab, hævede øjne, nervøsitet, hurtig puls
- Underaktiv skjoldbruskkirtel (hypothyreose)
 - Kuldefølelse, uforklarlig vægtstigning, tiltagende træthed, nyligt opstået forstoppelse

Immun trombocytopeni (ITP)

- Små, spredte, røde, lyserøde eller violette pletter på huden, tendens til at få blå mærker, blødning fra et snitsår, der er sværere at standse end normalt, kraftigere, længere eller hyppigere menstruationer end normalt
- Blødning fra tandkødet eller fra næsen, som er nyopstået eller er sværere at standse end normalt, hoste med blod
- Ledsmerter eller hævede led

Nyresygdomme, herunder anti-glomerulær basalmembran-sygdom (anti-GBM-sygdom)

- Blod i urinen, som kan være rød eller tefarvet, hævede ben eller fødder, hoste med blod

Autoimmun leverbetændelse (hepatitis)

- Uforklarlig kvalme, opkastning, udmattelse, mavesmerter, appetitmangel, oppustethed
- Gulfarvning af huden og øjnene og/eller mørkfarvet urin, større tendens end normalt til at bløde eller få blå mærker

Hæmfagocytisk lymfocytose (HLH)

- Uforklarlig høj feber, kraftig hovedpine, nakkestivhed, hævede lymfekirtler, gulfarvning af huden, hududslæt

Erhvervet hæmofili A

- Blødning fra et snitsår, der er sværere at standse end normalt
- Pludselige blå mærker, næseblod, smertefulde eller hævede led

Trombotisk trombocytopenisk purpura (TTP)

- Blå mærker på huden eller i munden, som kan ligne røde nålestiklignende punkter, med eller uden ekstrem træthed, feber, forvirring, taleforstyrrelser, gulfarvning af huden eller øjnene (gulst), nedsat urinmængde, mørkfarvet urin

Stills sygdom hos voksne (adult-onset Still's disease, AOSD)

- Feber over 39°C, der varer mere end 1 uge, smerte, stivhed med eller uden hævelse i flere led og/eller hududslæt.

Autoimmun hjernebetændelse (Autoimmun encefalit, AIE)

- Adfærdsmæssige og/eller psykiatriske ændringer, bevægeforstyrrelser, kortidshukommelsestab eller anfald såvel som andre symptomer der kan ligne et MS-angreb.