

# PATIENTKORT

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på, når du tager Aubagio. Læs venligst indlægssedlen for flere oplysninger.



## Generelle retningslinjer

Vis dette kort til den eller de læger og øvrige sundhedspersoner, der bliver involveret i din behandling (f.eks. i tilfælde af uventede helbreds-mæssige problemer).

AUBAGIO er tilgængeligt som 14 mg og 7 mg tabletter.

En gang dagligt  
**AUBAGIO**  
(teriflunomid) 14 mg tabletter

**sanofi**

MAT-DK-2100599v2.0/04.10.2023

Patientens navn: \_\_\_\_\_

Dato for første ordination af Aubagio®: \_\_\_\_\_

Klinikkens navn: \_\_\_\_\_

Den behandlende læges navn: \_\_\_\_\_

Den behandlende læges telefonnummer: \_\_\_\_\_



## Vigtige bivirkninger

Dette lægemiddel kan påvirke din leverfunktion, dit blodtryk og bestemte blodceller, der spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af infektioner.

## Kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

- Huden eller det hvide i øjnene bliver gult, mørkfarvet urin, kvalme eller opkastning og mavesmerter. Det kan være tegn på, at du har problemer med leveren.
- Høj feber, hoste, rysten, kulderystelser, hævede lymfekirtler, nedsat eller smertefuld vandladning. Det kan være tegn på, at du har en infektion.



## Kun for kvinder i den fødedygtige alder samt piger og deres forældre/omsorgspersoner: Graviditet

- Du må ikke begynde at tage Aubagio, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. Lægen vil muligvis bede dig tage en graviditetstest.
- Du skal anvende sikker prævention, mens og efter du tager Aubagio. Din læge vil vejlede dig om potentielle risici for fosteret og behovet for sikker prævention.
- **Kontakt din læge, hvis du vil ændre præventionsform eller gerne vil blive gravid.**
- Hvis du bliver gravid eller tror, at du er blevet gravid, skal du stoppe med at tage Aubagio og **straks kontakte lægen.**
- Hvis du er gravid, vil lægen muligvis foreslå en behandling med et særligt lægemiddel, der hurtigt og effektivt kan fjerne Aubagio fra kroppen.
- Du skal tale med lægen, hvis du ønsker at amme dit barn.
- Til forældre/omsorgspersoner eller piger: Kontakt lægen når patienten får sin første menstruation for at sikre, at I får vejledning om den potentielle risiko for fosteret og behovet for prævention.