

AUBAGIO er tilgængeligt som 14 mg og 7 mg tabletter.



- **Tal med patienten om de risici, der er nævnt i brochuren.**
- **Læs venligst produktresumeeet for en udførlig produktbeskrivelse.**

Patientens navn:		Patientens alder:	
Dato for første besøg:	Patientens køn:	<input type="checkbox"/> Mand	<input type="checkbox"/> Kvinde
Dato for første ordination:	Dags dato:		

DRØFTES

Komplet blodtælling

- Risiko for nedsat antal blodceller (påvirker hovedsageligt de hvide blodceller)
- Udfør komplet blodtælling før behandlingen og efterfølgende ved behov baseret på kliniske tegn og symptomer under behandlingen

Risiko for (alvorlige opportunistiske) infektioner

- Drøft nødvendigheden af at kontakte lægen, hvis patienten udvikler symptomer på infektion eller hvis patienten

- tager andre lægemidler, som påvirker immunsystemet
- I tilfælde af alvorlig infektion bør accelereret eliminationsprocedure overvejes

Blodtryk

- Risiko for hypertension
- Mål blodtrykket før behandlingen og periodisk under behandlingen
- Drøft nødvendigheden af at kontakte lægen, hvis patienten udvikler hypertension

Risiko for leverpåvirkning

- Leverfunktionen skal testes før behandlingen og periodisk under behandlingen
- Tegn og symptomer på leversygdom
- Drøft nødvendigheden af at kontakte lægen med det samme, hvis patienten udvikler symptomer

Til kvinder i den fødedygtige alder, inklusiv unge

- Potentiel risiko for teratogenicitet

- Tjek graviditetsstatus inden behandlingsopstart
- Tjek for potentiel graviditet hos alle kvinder i den fødedygtige alder, også patienter under 18 år
- Graviditet skal udelukkes
- Kvinden skal anvende sikker antikonception før opstart, under og efter behandling
- Patienten skal kontakte lægen med det samme, hvis der stoppes med brug af prævention eller før et skifte i type af prævention foretages

- I tilfælde af graviditet skal Aubagio seponeres og lægen kontaktes med det samme
- I tilfælde af graviditet bør accelereret eliminationsprocedure overvejes

Forældre/omsorgspersoner til unge kvinder under 18 år

- Drøft nødvendigheden af at kontakte lægen, når den unge kvinde får sin første menstruation

UDLEVERES

Patientkort:

- Udfyld kontaktinformationerne på patientkortet og erstat det, når det er nødvendigt
- Udlever et patientkort til patienten, og tal regelmæssigt med patienten om indholdet ved hver konsultation dog **mindst en gang årligt**
- Oplys patienten om at vise patientkortet til læger/sundhedspersoner involveret i deres behandling (specielt i nødsituationer)
- Mind patienten om at kontakte lægen, hvis han/hun får nogle af de symptomer på **leverproblemer** og **infektion**, som er beskrevet i patientkortet
- Vejled og informer kvindelige patienter inklusiv unge som er i den fødedygtige alder/deres forældre/omsorgspersoner om den potentielle risiko for fosteret

Patienten er blevet oplyst om og har forstået ovennævnte risici og fordele ved denne behandling

Den ordinerende læges navn

Den ordinerende læges underskrift