

Den behandlende læges telefonnummer:

Den behandlende læges navn

Klinikens navn:

Dato for første ordination af Aubagio

Patientens navn:

## PATIENTKORT

Dette patientkort indeholder vigtig sikkerhedsinformation, som du skal være opmærksom på, når du tager Aubagio®. Læs venligst indlægssedlen for flere oplysninger.



### Generelle retningslinjer

Vis dette kort til den eller de læger og øvrige sundhedspersoner, der bliver involveret i din behandling (f.eks. i tilfælde af uventede helbredsmæssige problemer).

Once-daily  
**AUBAGIO**<sup>®</sup>  
(teriflunomide) 14mg  
tablets

AUBAGIO is available in 14 mg and 7 mg tablets.

Denne vejledning er baseret på engelsk version maj 2024, godkendt af Lægemiddelstyrelsen oktober 2024.  
VV-PV-0558612, V2.0.

**sanofi**



## Vigtige bivirkninger

Dette lægemiddel kan påvirke din leverfunktion, dit blodtryk og bestemte blodceller, der spiller en vigtig rolle i bekæmpelsen af infektioner.

## Kontakt straks lægen, hvis du oplever en eller flere af følgende bivirkninger:

- Huden eller det hvide i øjnene bliver gult, mørkfarvet urin, kvalme eller opkastning og mavesmerter. Det kan være tegn på, at du har problemer med leveren.
- Høj feber, hoste, rysten, kulderystelser, hævede lymfekirtler, nedsat eller smertefuld vandladning. Det kan være tegn på, at du har en infektion.



## Til fertile kvinder samt piger og deres forældre/omsorgspersoner

- Du må ikke begynde at tage Aubagio, hvis du er gravid eller tror, at du er gravid. Lægen vil muligvis bede dig tage en graviditetstest
- Du skal anvende sikker prævention, mens og efter du tager Aubagio. Din læge vil vejlede dig om potentielle risici for fosteret og behovet for sikker prævention
- Kontakt din læge, hvis du vil ændre præventionsform eller gerne vil blive gravid.
- Hvis du bliver gravid eller tror, at du er blevet gravid, skal du stoppe med at tage teriflunomid og **straks kontakte lægen**.
- Hvis du er gravid, vil lægen muligvis foreslå en behandling med et særligt lægemiddel, der hurtigt og effektivt kan fjerne teriflunomid fra kroppen.
- Du skal tale med lægen, hvis du ammer eller ønsker at amme dit barn.
- Til forældre/omsorgspersoner eller piger: Kontakt lægen når patienten får sin første menstruation for at sikre, at I får vejledning om den potentielle risiko for fosteret og behovet for prævention.