

PATIENT GUIDE

VIGTIG SIKKERHEDSINFORMATION

Denne guide giver information om:

- Hvad er ENJAYMO (sutimlimab)?
- Risikoen for alvorlige infektioner og meningokokinfektioner
- Vaccinationsanbefalinger
- Symptomer på infektioner, som du skal være opmærksom på under behandling med ENJAYMO (sutimlimab)

Hvad du skal vide om ENJAYMO (sutimlimab)



Hvad er ENJAYMO (sutimlimab)?^{1,2}

ENJAYMO (sutimlimab) er et receptpligtigt lægemiddel, der anvendes til behandling af nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi) hos voksne med kuldeagglutinin syndrom (Cold Agglutinin Disease, CAD). Det reducerer blodmangel (anæmi) og mindsker træthed.



Hvad er CAD?¹

CAD er en sjælden blodsygdom, som medfører at visse antistoffer i immunsystemet binder sig til de røde blodlegemer. Dette forårsager en nedbrydning af røde blodlegemer (hæmolytisk anæmi).

Risiko for infektion ved ENJAYMO (sutimlimab) behandling^{1,2}

ENJAYMO (sutimlimab) hjælper med at forebygge nedbrydningen af røde blodlegemer ved at påvirke en del af dit immunsystem kendt som komplementsystemet. Dette system hjælper normalt med at nedkæmpe infektioner i din krop. Derfor er alvorlige infektioner (lungebetændelse, blodforgiftning) og meningokokinfektioner anset for at være blandt risiciene ved ENJAYMO (sutimlimab) behandling.

Vaccinationer^{1,2}

Før behandling med ENJAYMO (sutimlimab) vil lægen diskutere vigtigheden af vaccinationer med dig.

- Tjek hos din læge om du er vaccineret i overensstemmelse med de aktuelle lokale anbefalinger og også har modtaget meningokok- og streptokokvacciner.
- Det anbefales, at du får meningokok- og streptokokvaccinationerne mindst 2 uger før, du får den første dosis af ENJAYMO (sutimlimab), hvis du ikke er blevet vaccineret før.



Hvad du skal vide om ENJAYMO (sutimlimab)



Vaccinationer (fortsat)^{1, 2}

- Selvom du tidligere er blevet vaccineret, bør du revaccineres. Din læge vil rådgive dig om, hvorvidt du har brug for yderligere vaccinationer mod meningokok- og streptokokinfektioner.
- Hvis lægen beslutter, at akut behandling med ENJAYMO (sutimlimab) er nødvendigt, bør du vaccineres hurtigst muligt efter første behandling.
- Vaccination mod bestemte bakterielle infektioner kan hjælpe med at reducere risikoen for at få disse infektioner, men forhindrer ikke altid, at du får dem.



Symptomer og tegn på infektioner som du skal være opmærksom på^{1, 2}

Fortæl det til lægen, hvis du har en infektion, herunder en vedvarende infektion såsom hiv, hepatitis B eller hepatitis C. Kontakt straks lægen, hvis du oplever symptomer eller tegn på en infektion under behandling med ENJAYMO (sutimlimab), såsom:

- Feber med eller uden udslæt
- Kuldefølelse/kulderystelser
- Influenzalignende symptomer
- Hoste/åndedrætsbesvær
- Hovedpine med kvalme, opkastning, nakkestivhed, stivhed i ryggen
- Forvirring
- Lysfølsomme øjne
- Smerter ved vandladningen eller øget vandladning

Yderligere information

For mere information om **ENJAYMO** (sutimlimab) skal du kontakte
Sanofi A/S
Tlf: +45 45 16 70 00
e-mail: medinfo.dk@sanofi.com

For konkrete spørgsmål om din sygdom eller din behandling skal du kontakte egen læge.

Reference

1. [ENJAYMO \(sutimlimab\) Produktresumé](#)
2. [ENJAYMO \(sutimlimab\) Indlægsseddel](#)