

હકીકતો:

એપિલેપ્સીથી પીડાતા 65% ટકાથી વધુ લોકો યોગ્ય સારવાર સાથે ૭ મહિનાની અંદર એપિલેપ્સી-મુક્ત બની શકે છે.¹¹



References:

1. GBD 2016 Epilepsy Collaborators. Global, regional, and national burden of epilepsy, 1990-2016: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2016. *Lancet Neurol.* 2019 Apr;18(4):357-375.
2. India State-Level Disease Burden Initiative Neurological Disorders Collaborators. The burden of neurological disorders across the states of India: The Global Burden of Disease Study 1990-2019. *Lancet Glob Health.* 2021 Aug;9(8):e1129-e1144.
3. Hu Y, Shan Y, Du Q, Ding Y, Shen C, Wang S, Ding M, Xu Y. Gender and Socioeconomic Disparities in Global Burden of Epilepsy: An Analysis of Time Trends From 1990 to 2017. *Front Neurol.* 2021 Apr 16;12:643450.
4. Voitiuk AA. Epilepsy: Age and gender aspects. *Archives in Neurology & Neuroscience.* 2019 May 29;3(4).
5. Epilepsy or seizures – discharge [Internet]. Available at: <https://medlineplus.gov/ency/patientinstructions/000128.htm>. Accessed on Feb 13, 2023.
6. Kaur S, Garg R, Aggarwal S, Chawla SPS, Pal R. Adult onset seizures: Clinical, etiological, and radiological profile. *J Family Med Prim Care.* 2018 Jan-Feb;7(1):191-197.
7. Schachter SC. Seizure triggers [Internet] [Updated 2022]. Available at: <https://www.epilepsy.com/what-is-epilepsy/seizure-triggers/#What-are-some-commonly-reported-triggers?> Accessed on Oct 20, 2022.
8. Medical management of epilepsy [Internet]. Available at: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/epilepsy/medical-management-of-epilepsy>. Accessed on Feb 13, 2023.
9. Safety at work [Internet]. Available at: <https://www.epilepsy.com/preparedness-safety/staying-safe/safety-work>. Accessed on Feb 13, 2023.
10. Advice for patients who have epilepsy and/or seizures [Internet] [Updated Jun 2017]. Available at: https://www.stgeorges.nhs.uk/wp-content/uploads/2015/06/AMC_SAE_01.pdf. Accessed on Oct 20, 2022.
11. Mehndiratta MM, Kukkuta Sarma GR, Tripathi M, Ravat S, Gopinath S, Babu S, Mishra UK. A Multicenter, Cross-Sectional, Observational Study on Epilepsy and its Management Practices in India. *Neurol India.* 2022 Sep-Oct;70(5):2031-2038.

IMA-IN-2301337-V1-06-06/2023

પુરુષો

sanofi



પુરુષોમાં
એપિલેપ્સી



વૈશ્વિક સ્તરે દર 1,00,000 પુરુષોએ 330 પુરુષો એપિલેપ્સીથી પીડાય છે.¹
ભારતમાં 5 લાખથી વધુ પુરુષો એપિલેપ્સીથી પીડાય છે.²

સામાન્ય રીતે, પુરુષોમાં સ્ત્રીઓની તુલનામાં એપિલેપ્સી આવવાનું જોખમ વધારે હોઈ શકે છે, સંભવતઃ જોખમી પરિબલોના ઊંચા સંસર્ગને કારણે જેમ કે:^{3,4}



કાર્યસ્થળ પર માથામાં ઈજા થવાની શક્યતા



દારૂનું સેવન



ઊંઘનો અભાવ

જો તમે એપિલેપ્સીથી પીડાતા હો, તો તેનો અર્થ એ નથી કે તમે સક્રિય જીવનશૈલી જીવી શકતા નથી. તમારે ફક્ત આગળની યોજના બનાવવી જોઈએ અને સંભવિત જોખમોને ટાળવું જોઈએ.⁵

અહીં કેટલીક ટિપ્સ આપવામાં આવી છે, જેને તમે તમારી રોજિંદી જીવનશૈલીમાં અપનાવી શકો છો:

આ સ્થિતિને શું ટ્રિગર કરી શકે છે તે સમજો અને તેમને ટાળો.^{6,7}



દિવસ કે રાતનો ચોક્કસ સમય



ઝળઝળતી તેજસ્વી લાઈટો



ઊંઘનો અભાવ



દારૂનો ભારે ઉપયોગ અથવા દારૂનો ઉપાડ



મનોરંજક દવાઓ



તાણ



ડિહાઈડ્રેશન



લોહીમાં સોડિયમ, કેલ્શિયમ અથવા ગ્લુકોઝનું નીચું સ્તર



વધુ પડતું કેફીન



અમુક દવાઓનો ઉપયોગ



દવાઓ લેવાનું ચૂકી જવું



બીમારી (તાવ સાથે/વગર)



ચક્રિત અથવા કિડનીની સમસ્યાઓના કારણે મગજની કાર્યક્ષમતા નબળી પડી જાય છે

રોજબરોજની પ્રવૃત્તિઓ કરતી વખતે સાવચેતી રાખવી

માથામાં ઈજા પહાંચી શકે તેવા કાર્યો કરતી વેળાએ તમારી જાતને સુરક્ષિત રાખો, દા.ત.:

- રમતો રમતી વખતે હેલ્મેટ પહેરો⁸
- ઊંચાઈ પર કામ કરતા લોકો માટે હેલ્મેટ અને કમર હાર્નેસ⁹
- મશીનરીની આસપાસ કામ કરતા લોકો માટે સેફ્ટી ગાડ્સ⁹

સ્વિમિંગ કરતી વખતે, ખાતરી કરો કે તમારો કોઈ મિત્ર છે જે સ્વિમ કરી શકે છે અથવા લાઈફગાર્ડ આસપાસ છે.^{5,10}

એવા સ્થાનો અથવા પરિસ્થિતિઓને ટાળો જે તમને તેજસ્વી પ્રકાશમાં લાવી શકે⁵ કપડાને ઈસ્ત્રી કરતી વખતે તમારી આસપાસ કોઈને રાખો¹⁰

સાર્વજનિક ટ્રેનોનો ઉપયોગ કરતી વખતે પીળી લાઈનની પાછળ સારી રીતે ઊભા રહો¹⁰

એપિલેપ્સીની સારવાર માટે સૂચવવામાં આવેલી દવાઓને અવગણશો નહીં. આલ્કોહોલ/મનોરંજન દવાઓ ટાળો કારણ કે તે તમારા શરીરની દવાઓને પ્રતિસાદ આપવાની રીત બદલી શકે છે.⁵

