

## അപസ്ഥാരത്തിൽ ആദ്യമായി

**sanofi**

ചുഴലി സമയത്ത് ആ പ്രക്രിയുടെ ചലനങ്ങൾ തടയാൻ ശ്രമിക്കരുത്.<sup>8</sup>

അവരുടെ ശരീരം വിറക്കുന്നത് നിന്ന ശ്രേഷ്ഠ, അവരെ വശന്തേതക്ക് തിരിക്കുക. എന്നിരുന്നാലും, ചുഴലി ഉണ്ടാക്കുന്നും അവരുടെ വായിൽ ഭക്ഷണമോ ഭ്രാവകമോ ഉണ്ടകിൽ, ഉടൻ തന്നെ അവരെ അവരുടെ വശന്തേതക്ക് പരിക്കുക.<sup>4,7</sup>

രോഗി സുഖം പ്രാപിക്കുന്നതുവരെ അവരോടൊപ്പം നിൽക്കുകയും അവരോട് ശാന്തമായി സംസാരിക്കുകയും ചെയ്യുക



സാധ്യമെങ്കിൽ, ചുഴലി ആരംഭിച്ചതും അപസ്ഥാനിച്ചതുമായ സമയം ശ്രദ്ധിക്കുക

ചുഴലിക്ക് ശ്രേഷ്ഠ അവർ ഉറങ്ങുകയാണെങ്കിൽ, അവരും ശല്യപ്രവർത്തനരുത്; എന്നിരുന്നാലും, അവരുടെ ശ്രസന്ന പരിശോധിക്കുക.<sup>8</sup>

ചുഴലി 5 മിനിറ്റിൽ കൂടുതൽ നീണ്ടുനിന്നാലോ, പ്രക്രി പുൽണ്ണമായി ബോധം വീണ്ടും ഉണ്ടാക്കാനും ചുഴലിക്കിട്ടും, ചുഴലിക്കിട്ടും ശുരൂതരമായി പരിക്കേറ്റാലോ അടിയന്തിര ഏവദൃംശഗായം തേടുക.<sup>7</sup>



## വസ്തുത



അപസ്ഥാനം ബാധിച്ച ജീവിക്കുന്നവരിൽ  
70% വരെ ആളുകൾക്ക് ചുഴലി വിരുദ്ധ  
മരുന്നുകളുടെ ഉചിതമായ  
ഉപയോഗത്തിലൂടെ ചുഴലിയിൽനിന്ന്  
മുക്കരാക്കാം.

### Reference

- Epilepsy [Internet] [Updated Feb 9, 2022]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. Accessed on 20 Oct 2022.
- Trinka E, Kwan P, Lee B, Dash A. Epilepsy in Asia: Disease burden, management barriers, and challenges. *Epilepsia*. 2019 Mar;60 Suppl 1:7-21.
- Evaluation of a first-time seizure [Internet]. Available at: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/epilepsy/evaluation-of-a-firsttime-seizure>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Seizures [Internet]. Available at: <https://www.healthdirect.gov.au/seizures#how-to-help>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Epilepsy in Children. Available at: <https://medlineplus.gov/ency/article/007681.htm>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Seizures. Available at: <https://kidshealth.org/en/parents/seizure.html>. Accessed on 12 Jan 2023.
- What to do if someone has a seizure (fit) [Internet]. Available at: <https://www.nhs.uk/conditions/what-to-do-if-someone-has-a-seizure-fit/#:~:text=Support%20them%20gently%20and%20cushion,until%20they%20have%20fully%20recovered>. Accessed on 13 Feb 2023.
- General first aid for seizures [Internet]. Available at: <https://www.epilepsy.com/recognition/seizure-first-aid>. Accessed on Feb 13, 2023.

MAT-IN-2301336-V1.0-06/2023

## ആര്യോള്ളതലയത്തിൽ പ്രതിവർഷം 5 ദശലക്ഷം ആളുകൾക്ക് അപസ്ഥാരം നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.<sup>1</sup>



ഇന്ത്യയിൽ ഓരോ വർഷവും  
1,00,000-ൽ 60 പേരുകൾ  
അപസ്ഥാരം  
നിർണ്ണയിക്കപ്പെടുന്നു.



നിങ്ങളുടെ കൂടുംബത്തിൽ ആർഡൈക്കിയും അപസ്ഥാരമോ  
ചൂഴലിയോ ഉണ്ടോ എന്ന് നിങ്ങൾക്ക് എങ്ങനെ തിരിച്ചറിയാനാകും?

- ചൂഴലി സമയത്ത്, ആ വ്യക്തി തന്റെ പ്രവർത്തനത്തിൽ ശ്രദ്ധ കേന്ദ്രീകരിക്കുന്നത് നിർത്തുകയും, തുറിച്ചുനോക്കുകയും വേഗത്തിൽ കണ്ണ് ചിന്മുകയും അഭ്യുക്തിൽ ആശയക്കൂഴപ്പത്തിലായാതായി കാണപ്പെടുകയും ചെയ്യുന്നതായി നിങ്ങൾ നിരീക്ഷിച്ചേക്കാം.<sup>3,4</sup>
- അവർ പെട്ടെന്ന് വീണേക്കാം<sup>3</sup>
- അവരുടെ ഒക്കകളോ കാല്യകളോ തുടർച്ചയായി വിനയ്ക്കുന്നു<sup>3</sup>
- അവരുടെ ശരീരം ദ്വാഹാകുന്നു<sup>3</sup>
- മുത്രമൊഴിക്കുന്നതിനോ മല വിസർജ്ജനത്തിനോ ഉള്ള നിയന്ത്രണം അവർക്ക് നഷ്ടപ്പെടുകയാം<sup>3</sup>
- നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്ന ഒന്നിനോടും അവർ പ്രതികരിച്ചേക്കിണ്ണ
- അവരുടെ വായിൽ നിന്ന് അധിക ഉലിനീൽ വന്നേക്കാം<sup>4</sup>
- ചവയ്ക്കുന്നത് പോലുള്ള ആവർത്തിച്ചുള്ള ചലനങ്ങൾ അവർ നടത്തുന്നുണ്ടാകാം<sup>4</sup>
- അവർ നിരന്തരം തല കുല്യുക്കിയേക്കാം, തുടർന്ന് ബോധാം അഭ്യുക്തിൽ അവബന്ധം നഷ്ടപ്പെടുകയോ ചെയ്യും<sup>3</sup>

- ചിലർക്ക് ശരസന പ്രശ്നങ്ങൾ അനുഭവപ്പെടാം, അവരുടെ ചുണ്ടുകൾ നീംകലർന്ന നിന്മാകാം<sup>3</sup>
- കൂടാതെ, ചൂഴലിക്ക് തൊട്ടുമുന്ന്, ചിലർക്ക് തരിപ്പോ, അവിടെ ഇല്ലാത്ത എന്നെന്നുള്ള മണം പോലെയുള്ള പിച്ചിത്രമായ സംവോദനങ്ങൾ ഉണ്ടാകാം. അവർക്ക് അസന്നധനയോ പരിഭ്രമമോ അനുഭവപ്പെടാം.<sup>3,5</sup>

ഒരു ചൂഴലിക്ക് ശേഷം, വ്യക്തിക്ക്  
ആശയക്കുഴപ്പം, കൂഴിണം, ഉറക്കം,  
ദാഹം അല്ലെങ്കിൽ തലവേദന  
എന്നിവ അനുഭവപ്പെടാം. ഈ  
കുറച്ച് മിനിറ്റ് നീംടുനിന്നേക്കാം.<sup>3,4,6</sup>



നിങ്ങളുടെ വീട്ടിൽ ഒരാൾക്ക് ചൂഴലി ഉണ്ടാകുന്നത് ആദ്യമായി  
കാണുന്നോൾ നിങ്ങൾ ഉത്കണ്ടാക്കുവരായേക്കാം.  
എന്നിരുന്നാലും, അത്തരം സമയങ്ങളിൽ, നിങ്ങൾ ശാന്തര  
പാലിക്കുകയും അവരെ സഹായിക്കാൻ ഇല  
ചളിത്രമായ കാര്യങ്ങൾ ചെയ്യുകയും വേണം:



അവർ നിലത്ത് കിടക്കുകയാണെങ്കിൽ, അവരുടെ തലയ്ക്ക് താഴെ മൃദുവായ  
എന്നെന്നുള്ള പയ്ക്കുക.<sup>7</sup>

വീൽചെയറിൽ ഇരിക്കുന്ന വ്യക്തിയാണെങ്കിൽ, ഫ്രേക്കൂം സൈറ്റ് ബെൽറ്റും ഇട്ട് തലക്ക്  
പിന്നിൽ കൂഷ്യൻ പയ്ക്കുക. എന്നാൽ, അവരുടെ നീക്കാൻ  
ശ്രമിക്കരുത്.<sup>7</sup>

പരിക്ക് തടയാൻ അടുത്തുള്ള വസ്തുകൾ നീക്കുക<sup>8</sup>

കഴുത്തിന് ചുറ്റു കോൾ ബട്ടണോ ഒട്ടയോ പോലുള്ള ഇരുക്കിയ വസ്തുങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കിൽ  
അംത് നീക്കം ചെയ്യുക. ഈ രോഗിയെ ശസ്ത്രിക്കാൻ സഹായിക്കും.<sup>7</sup>

അവർ പുർണ്ണമായി സാധാരണ നിലയിൽ ആയിരുള്ളുകിൽ ബെള്ളം, ഭക്ഷണം, മരുന്നുകൾ  
തുടങ്ങിയ ഔന്നും അവരുടെ വായിൽ പയ്ക്കുവുത്. കാരണം, ഭക്ഷണമോ ബെള്ളമോ  
മരുന്നുകളോ അവരുടെ ശാസനകോശത്തിലേക്ക് പോകുകയും ശാസംമുട്ടിന്  
കാരണമാകുകയും ചെയ്യും.<sup>7,8</sup>

അവർ ശരിയായി ശസ്ത്രിക്കുന്നുണ്ടെന്ന് ഉറപ്പുവരുത്തുക<sup>8</sup>

