

ਮਿਰਗੀ ਲਈ ਨਵਾਂ

sanofi

ਦੌਰੇ ਦੌਰਾਨ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ<sup>8</sup>

ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਗੋਰ ਦਾ ਕੰਬਲਾ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਜੇ ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਵੇਲੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਭੋਜਨ ਜਾਂ ਤਰਲ ਪਦਾਰਥ ਸੀ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਤੁਰੰਤ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਮੋੜੋ।<sup>4,7</sup>

ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਮਹੀਨੀ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਰਹੋ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਸਾਂਤੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ<sup>7</sup>

ਜੇ ਸੰਭਵ ਹੋਵੇ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਨੂੰ ਨੋਟ ਕਰੋ ਜਦੋਂ ਦੌਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਅਤੇ ਕਦੇ ਖਤਮ ਹੋਇਆ<sup>7</sup>



ਜੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੌ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਪਰੋਸ਼ਾਨ ਨਾ ਕਰੋ; ਹਾਲਾਂਕਿ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਹ ਦੀ ਜਾਂਚ ਰੱਖੋ<sup>8</sup>

ਐਮਰਜੈਂਸੀ ਡਾਕਟਰੀ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਾਲ ਕਰੋ ਜੇਕਰ ਦੌਰਾ 5 ਮਿੰਟਾਂ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਮੇਂ ਲਈ ਚੱਲਿਆ ਹੈ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੋਸ਼ ਨਹੀਂ ਆਇਆ ਹੈ, ਜਾਂ ਜੇ ਉਹ ਦੌਰੇ ਦੇ ਹਾਲੇ ਦੌਰਾਨ ਚੰਡੀਰ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਜ਼ਖਮੀ ਹੋ ਰਾਏ ਹਨ<sup>7</sup>



## ਤੱਥ



**ਮਰਗੀ ਨਾਲ ਰਹਿ ਰਹੇ 70% ਤੱਕ  
ਲੋਕ ਦੌਰੇ-ਰੋਕੁ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ  
ਉਚਿਤ ਵਰਤੋਂ ਨਾਲ ਦੌਰੇ-ਮੁਕਤ  
ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।**

## Reference

- TrinkEpilepsy [Internet] [Updated Feb 9, 2022]. Available at: <https://www.who.int/news-room/fact-sheets/detail/epilepsy>. Accessed on 20 Oct 2022.
- Trinka E, Kwan P, Lee B, Dash A. Epilepsy in Asia: Disease burden, management barriers, and challenges. *Epilepsia*. 2019 Mar;60 Suppl 1:7-21.
- Evaluation of a first-time seizure [Internet]. Available at: <https://www.hopkinsmedicine.org/health/conditions-and-diseases/epilepsy/evaluation-of-a-firsttime-seizure>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Seizures [Internet]. Available at: <https://www.healthdirect.gov.au/seizures#how-to-help>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Epilepsy in Children. Available at: <https://medlineplus.gov/ency/article/007681.htm>. Accessed on 13 Feb 2023.
- Seizures. Available at: <https://kidshealth.org/en/parents/seizure.html>. Accessed on 12 Jan 2023.
- What to do if someone has a seizure (fit) [Internet]. Available at: <https://www.nhs.uk/conditions/what-to-do-if-someone-has-a-seizure-fit/#:~:text=Support%20them%20gently%20and%20cushion,until%20they%20have%20fully%20recovered>. Accessed on 13 Feb 2023.
- General first aid for seizures [Internet]. Available at: <https://www.epilepsy.com/recognition/seizure-first-aid>. Accessed on Feb 13, 2023.

MAT-IN-2301336-V1.0-06/2023

## ਵਿਸ਼ਵ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਹਰ ਸਾਲ 5 ਮਿਲੀਅਨ ਲੋਕ ਮਿਰਗੀ ਲਈ ਨਿਦਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ<sup>1</sup>



**ਭਾਰਤ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ ਪ੍ਰਤੀ  
1,00,000 ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਲਗਭਗ  
60 ਲੋਕ ਮਿਰਗੀ ਦੇ ਸ਼ਿਕਾਰ  
ਹੁੰਦੇ ਹਨ**



ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਪਛਾਣ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ  
ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਦੌਰਾ ਪੈ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਫਿੱਟ ਹੈ?

- ਦੌਰੇ ਦੇ ਦੌਰਾਨ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗਤੀਵਿਧੀ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹ ਘੁਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਤੇਜ਼ੀ ਨਾਲ ਝਪਕ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਉਲੜਣ ਵਿੱਚ ਦਿੱਖਾਈ ਦੇ ਰਿਹਾ ਹੈ<sup>3,4</sup>
- ਉਹ ਅਚਾਨਕ ਡਿੱਗ ਸਕਦੇ ਹਨ<sup>3</sup>
- ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਬਾਹਰ ਜਾਂ ਲੱਤਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਬ ਰਹੀਆਂ ਹਨ<sup>3</sup>
- ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸਗਰ ਕਠੋਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ<sup>3</sup>
- ਉਹ ਪਿਸ਼ਾਬ ਕਰਨ ਜਾਂ ਮਲ ਨਿਕਾਸੀ 'ਤੇ ਕੰਟਰੋਲ ਗੁਆ ਸਕਦੇ ਹਨ<sup>3</sup>
- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਜਵਾਬ ਨਾ ਦੇਣ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁਛਦੇ ਹੋ<sup>3</sup>
- ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚੋਂ ਵਾਧੂ ਥੁੱਕ ਨਿਕਲ ਸਕਦਾ ਹੈ<sup>4</sup>
- ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਦੁਹਰਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ ਹਰਕਤਾਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋਣ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਚਥਾਉਣਾ<sup>4</sup>
- ਉਹ ਲਗਾਤਾਰ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਹਿਲਾ ਵੀ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਚੇਤਨਾ ਜਾਂ ਜਾਗਰੂਕਤਾ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ<sup>3</sup>

- ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬੁੱਲ੍ਹਾਂ ਦਾ ਰੰਗ ਨੀਲਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ<sup>3</sup>
- ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਵਾ, ਦੌਰਾ ਪੈਣ ਤੋਂ ਠੀਕ ਪਹਿਲਾਂ, ਕੁਝ ਨੂੰ ਅਜੀਬ ਸੰਵੇਦਨਵਾਂ ਹੋ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਝਰਨਾਹਟ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਅਜਿਹੀ ਚੀਜ਼ ਸੁੰਘਲਾ ਜੋ ਉਥੋਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਉਹ ਬੇਚੈਨੀ ਜਾਂ ਘਰਾਹਟ ਵੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।<sup>3,5</sup>

**ਦੌਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਵਿਅਕਤੀ ਨੂੰ ਉਲੜਣ,  
ਬਕਾਵਟ, ਨੀਂਦ, ਪਿਆਸ, ਜਾਂ ਸਿਰ  
ਦਰਦ ਮਹਿਸੂਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ  
ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰਹਿ ਸਕਦਾ ਹੈ।<sup>3,4,6</sup>**



ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ  
ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਦੌਰਾ ਪਿਆ ਦੇਖ ਕੇ ਬੇਚੈਨ ਹੋਵੋ।  
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਅਜਿਹੇ ਸਮਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਂਤ ਰਹਿਣਾ  
ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਇਹ  
ਸਧਾਰਨ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ:



ਜੇ ਉਹ ਜ਼ਮੀਨ 'ਤੇ ਪਏ ਹਨ, ਤਾਂ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਹੇਠਾਂ ਕੋਈ ਨਹਮ ਚੀਜ਼ ਰਹੋ:

ਜੇਕਰ ਵਿਅਕਤੀ ਵ੍ਹੀਲਚੇਅਰ 'ਤੇ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਬੇਕ ਅਤੇ ਸੀਟਬੈਲਟ ਲਗਾਓ ਅਤੇ ਉਸ ਦੇ ਸਿਰ ਦੇ ਪਿੱਛੇ  
ਭਸ਼ਨ ਦਿਓ। ਪਰ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਿਲਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਨਾ ਕਰੋ।<sup>7</sup>



ਸੱਟ ਤੋਂ ਬਚਣ ਲਈ ਨੇੜੇ ਦੀਆਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰੋ<sup>8</sup>



ਜੇਕਰ ਗਰਦਨ ਦੇ ਆਲੋ-ਦੁਆਲੋ ਕੋਈ ਤੰਗ ਕੱਪੜੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਾਲਰ ਬਟਨ ਜਾਂ ਟਾਈ, ਤਾਂ ਇਸ ਨੂੰ  
ਹਟਾ ਦਿਓ। ਇਹ ਮਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਾਹ ਲੈਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ।<sup>7</sup>



ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁੰਹ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਨਾ ਪਾਓ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪਾਣੀ, ਭੋਜਨ, ਜਾਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਜਦੋਂ ਤੱਕ ਉਹ ਪੂਰੀ  
ਤਰ੍ਹਾਂ ਠੀਕ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ। ਇਹ ਇਸ ਲਈ ਹੈ ਕਿ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਵੀਂਹ ਦੀ ਬਜਾਏ  
ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫੇਫੜਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਨਾਲ ਦਮ ਘੁਟਣ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣਦਾ ਹੈ।<sup>7,8</sup>



ਜਕੀਨੀ ਬਲਾਓ ਕਿ ਉਹ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸਾਹ ਲੈ ਰਹੇ ਹਨ<sup>8</sup>