



**TAKSOTIERT® 80 ملخ/4 مل**

محلول يخفّف للتسريبي

دوسيتكيل

قارورة واحدة فقط.

لا يتطلب تاكسوتيير 80 ملخ/4 مل، محلول يخفّف للتسريبي

أي تخفيف سابق بمذنب وهو جاوز لكى يضاف إلى محلول

التسريبي.

كل قارورة مخصصة لاستعمال واحد فقط و يجب استعمالها

بعد فتحها مباشرةً في حال عدم الاستعمال الفوري، تكون

أوقات وشروط الحفظ قيد الاستعمال من مسوؤلية المستعمل.

قد يكون من الضروري استعمال أكثر من قارورة واحدة

الموصوفة بالمرضى، مثلاً، تتطلب جرعة من 140 ملخ من

دوسيتكيل، 7 مل من محلول دوسيتكيل الذي يخفّف

التسريبي.

يسحب طريقة تطهيرية المكمة المطلوبة من محلول الذي

الغوري، تكون أوقات وشروط الحفظ قيد الاستعمال من مسوؤلية

المستعمل.

عندما يضاف محلول دوسيتكيل على النحو الموصى

به في كيس التسريبي، يكون ثانيةً لست ساعات إذا خفظ في

حرارة ما دون 25 درجة مئوية، يجب استعماله في غضون

تاكسوتيير 80 ملخ/4 مل بيلج تركيز دوسيتكيل

20 ملخ/4 مل.

تم اخراج بحثة واحدة (مرة واحدة) في داخل كيس أو قارورة

تسريبي من 250 مل حتى إما على محلول غلوكيز 5%

تسريبي (محلول للتخفيف ومذنب) مع هذا الدواء (تاكسوتيير

التحضير للحقن داخل الوريد

تحضير محلول التسريبي

لا تستعمل لأدوية أخرى تحتوي على دوسيتكيل وهي عبارة عن

قارورتين (محلول للتخفيف ومذنب) مع هذا الدواء (تاكسوتيير

نشرة دوائية: معلومات للمريض

**TAKOTERE® 80 ملخ/4 مل**

محلول يخفّف للتسريبي

دوسيتكيل

الرجاء قراءة كامل هذه النشرة بعناية قبل البدء باستعمال

هذا الدواء لأنها تحتوي على معلومات مهمة لك.

احظ بهذه النشرة قد تحتاج إلى قراءتها مجددًا.

في حال كان لديك أي سؤال آخر، اسأل طبيب أو الصيدلي

في المستشفى أو المرضية.

في حال شعرت بأي تأثير جانباني، أعلم الطبيب أو الصيدلي

أو المرضية، ينطبق هذا أيضًا على أي تأثير جانباني غير

متكون في هذه النشرة، راجع القسم 4.

ماذا تحتوي هذه النشرة:

1. ما هو تاكسوتيير وما هي دواعي استعماله

2. ما هي المعلومات الواجب معرفتها قبل استعمال تاكسوتيير

3. كيف يُستعمل تاكسوتيير

4. ما هي التأثيرات الجانبية المحتملة

5. كيف يُحفظ تاكسوتيير

6. محتويات العلبة ومعلومات أخرى

1. ما هو تاكسوتيير وما هي دواعي استعماله

يحمل هذا الدواء تاسكسوتير. أما اسم الشانغ فهو دوسيتكيل.

دوسيتكيل هو مادة مستخلصة من أوراق أجاج المقصوس.

ينتني دوسيتكيل إلى مجموعة الأدوية المضادة للسرطان

والأسنان الأدوية التاكسوتيير.

وصف طبيك تاكسوتيير لعلاج سرطان الثدي أو بعض أشكال سرطان

الرئة (سرطان الرئة غير ذي الخلايا الصغيرة) أو سرطان البروستات

أو سرطان المعدة أو سرطان المالك الولياني الحضمية الطbia).

أحرر ومتقدراً وواسع النطاق مع تدابير تحت الجلد طفخاً

( بما في ذلك ثباتات الجلد والدين والأطراف العليا) وبثور مع

هي متقدراً طفخاً في طبقي العظام والمقدمة.

إذا أصبت بارتकاسات جلدية حادة أو بأي من ارتکاسات

المكتورة العاء، اتصل على الفور طبيبك أو ياخشاني

الرعاية الصحية.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية

إذا كنت تعاني من مشاكل في الكلى أو من مستويات مرتفعة

لحمض البروبيك في الدم قبل بدء العلاج بتاكسوتيير.

يعتني تاكسوتيير على الكحول، تحثت إلى طبيبك إذا كنت

تعاني من الإلام على الكحول أو من الصرع أو من ضفت

كبدى. راجع أيضًا فقرة « تاكسوتيير يحتوي على الإيثانول

(الكحول )» أدناه.

أدوية أخرى وتأكسوتير

الرجاء أن تعلم الطبيب أو الصيدلي في المستشفى إذا كنت

تأخذ حالياً أو أخذت مؤخرًا أي أدوية أخرى بما فيها تلك التي

حصلت عليها دون وصفة طبية، لأنَّ تاكسوتيير أو الدواء

الآخر قد يعطي مفعوله كما يجب وقد تصبح أكثر عرضة

للعرض لتأثيرات جانبية.

إن كمية الكحول التي يحتوي عليها هذا الدواء يمكن أن تغير

مفعول الأدوية الأخرى.

الحمل والخصوبة والإلراض

استشيري طبيبك قبل أخذ أي دواء.

لا ينبع أي تأثير تاكسوتيير إذا كنت حاملاً إلا إذا أنت

الطبيب ينكح ذلك بوضوح.

لا ينبع بك الإلراض خالل فترة علاج تاكسوتيير.

إذا كنت رجلًا ينبع تاكسوتيير أو تاكسوتيير بالتزامن مع

البرينزوز أو البرينزولون.

لا علاج سرطان الثدي المقتد، يمكن إعطاء تاسكسوتير بالتزامن

مع الميسيلاتين 5 - فيلورواوراسي.

لا علاج سرطان المعدة الافتراضي، يعطى تاسكسوتير بالتزامن

مع الميسيلاتين 5 - فيلورواوراسي.

تاسكسوتير بالتزامن مع الميسيلاتين 5 - فيلورواوراسي.

موانع الاستعمال

لا ينبع بك استعمال تاكسوتيير:

0. إذا كنت مصاباً بحساسية (فرط حساسية) ضد دوسيتكيل

أو ضد أحد المركبات الأخرى التي يحتوي عليها تاسكسوتير

(المكتورة في القسم 6).

0. إذا كان لديك عدد كريات الدم البيضاء لديك منخفضًا جدًا.

0. إذا كنت تعاني من قصور كبدى حاد.

تحفيزات وأسياط

قبل كل علاج بتاكسوتيير، سوف تجرى لك فحوصات دم الماك

ما إذا كان لديك عدد كافٍ من كريات الدم ووظيفته كافية

للتاثير تاكسوتيير. في حال وجود تحفيزات في كريات الدم البيضاء،

قد تضليل بالقى أو يهدى.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من إلراز أو دم في البازار أو من الحمى، يمكن أن تكون

نفف العوارض الإشارات الأولى لسمينة معوية خطيرة قد

تسبب الوفاة، يجب أن يقتصر طبيبك على القوى.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، في هذه الحالة، وخاصة في

حالة شوش الرؤية، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين

والنظر.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

أصبت بارتكاسات تحسسي بعد علاج بالباكتيكاسيل.

الرجاء إعلام الطبيب أو الصيدلي في المستشفى أو المرضية إذا

كنت تعاني من مشاكل في القوى، يجب أن يجري على القوى فحصاً للعينين