

## KULLANMA TALİMATI

### FURACİN % 0,2 merhem

#### Haricen kullanılır.

- **Etkin madde:** Her 100 gram merhem 0,2 gram nitrofurazon içerir.
- **Yardımcı maddeler:** Polietilen glikol 300, polietilen glikol 1000, polietilen glikol 4000

**Bu ilacı kullanmaya başlamadan önce bu KULLANMA TALİMATINI dikkatlice okuyunuz, çünkü sizin için önemli bilgiler içermektedir.**

- *Bu kullanma talimatını saklayınız. Daha sonra tekrar okumaya ihtiyaç duyabilirsiniz.*
- *Eğer ilave sorularınız olursa, lütfen doktorunuza veya eczacınıza danışınız.*
- *Bu ilaç kişisel olarak sizin için reçete edilmiştir, başkalarına vermeyiniz.*
- *Bu ilacın kullanımı sırasında, doktora veya hastaneye gittiğinizde doktorunuza bu ilacı kullandığınızı söyleyiniz.*
- *Bu talimatta yazılanlara aynen uyunuz. İlaç hakkında size önerilen dozun dışında **yüksek veya düşük** doz kullanmayınız.*

#### **Bu Kullanma Talimatında:**

1. **FURACİN nedir ve ne için kullanılır?**
2. **FURACİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**
3. **FURACİN nasıl kullanılır?**
4. **Olası yan etkiler nelerdir?**
5. **FURACİN'in saklanması**

#### **Başlıkları yer almaktadır.**

#### **1. FURACİN nedir ve ne için kullanılır?**

FURACİN cilt üzerine uygulanan ve karakteristik kokulu, limon sarısı renkte, opak, yarı şeffaf bir merhemdir.

FURACİN 56 g'lık ambalajda kullanıma sunulmaktadır.

FURACİN, ameliyat yaralarının enfeksiyondan korunmasında, duyarlı mikroorganizmaların (mikropların) oluşturduğu piyoderma (ciltteki sivilceli durum), dermatoz (deride oluşan hastalık) gibi cilt enfeksiyonlarında, kesik, yara, yanık ve ülser (derideki bir tür yara) enfeksiyonların ve otitis eksterna (dış kulak iltihabı) tedavisinde kullanılır.

#### **2. FURACİN'i kullanmadan önce dikkat edilmesi gerekenler**

#### **FURACİN'i aşağıdaki durumlarda KULLANMAYINIZ**

Eğer;

Nitrofurazona karşı veya FURACİN'in içeriğindeki diğer bileşenlerden herhangi birine alerjik (aşırı duyarlı) iseniz (Bkz. Yardımcı maddeler).

## **FURACİN'i ařağıdaki durumlarda DİKKATLİ KULLANINIZ**

Eęer;

- Yiyecekler, boyalar, koruyucular veya herhangi bir ilaca karřı bir alerjiniz varsa doktorunuza veya eczacınıza bildiriniz.
- Böbrek yetmezlięi durumlarında bu ilacı dikkatli kullanınız. FURACİN'in bileřiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmıř vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluęunuzu arttırabilir.
- Cildinizdeki yanık ya da yara düzelmezse veya daha kötüleřirse doktorunuza bařvurunuz.
- Cildinizde yerel hassasiyet ve tahriř belirtileri oluřtuysa ilacın kullanımına son veriniz ve doktorunuza bildiriniz.
- Cilt üzerine kullanılan antibakteriyel ilaçlar ile, seyrek olarak ilaca duyarlı olmayan mantarların da içinde olduęu bir grup mikroorganizma (mikrop) tarafından enfeksiyon oluřabilir. Eęer böyle bir durum oluřursa derhal doktorunuza bildiriniz.

Bu uyarılar, geęmiřteki herhangi bir dönemde dahi olsa sizin için geęerliyse lütfen doktorunuza danıřınız.

### **FURACİN'in yiyecek ve iecek ile kullanılması**

FURACİN haricen cilde uygulanan bir merhem olduęundan yiyecek ve ieceklerle etkileřmez.

### **Hamilelik**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

FURACİN'in hamilelerde kullanımı ile ilgili yeterli bilgi mevcut deęildir. Ancak yarar/zarar iliřkisi hekimce etraflı olarak deęerlendirilmek kořulu ile kullanılmalıdır.

*Tedaviniz sırasında hamile olduęunuzu fark ederseniz hemen doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

### **Emzirme**

*İlacı kullanmadan önce doktorunuza veya eczacınıza danıřınız.*

Emziriyorsanız FURACİN kullanmayınız.

### **Ara ve makine kullanımı**

FURACİN'in ara sürme ve makine kullanma konusunda bir etki yaratması olası deęildir.

### **FURACİN'in ierięinde bulunan bazı yardımcı maddeler hakkında önemli bilgiler**

Bileřiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmıř vücut bölgelerinden emilerek mevcut böbrek bozukluęunuzu arttırabilir.

### **Dięer ilaçlar ile birlikte kullanımı**

FURACİN'in dięer ilaçlarla bilinen bir etkileřimi bulunmamaktadır.

*Eęer reeteli ya da reetesiz herhangi bir ilacı řu anda kullanıyorsanız veya son zamanlarda kullandınız ise lütfen doktorunuza veya eczacınıza bunlar hakkında bilgi veriniz.*

### 3. FURACİN nasıl kullanılır?

- **Uygun kullanım ve doz/uygulama sıklığı için talimatlar:**

FURACİN'i doktorunuzun önerdiği süre ve miktarda uygulayınız. FURACİN, uygulama ya da pansuman şekline göre, günlük olarak veya birkaç günde bir enfeksiyonlu bölgeye iyileşme sağlanıncaya dek uygulanır. Tedaviye 7-10 gün devam edilmesi önerilir.

- **Uygulama yolu ve metodu:**

FURACİN cilt yüzeyine haricen uygulanır.

Lezyonların üzerine doğrudan doğruya bir gazlı bez veya spatül ile uygulanır. Geniş yanık alanlarına steril gazlı bez üzerine yayıldıktan sonra uygulanır.

Postoperatif (ameliyat sonrası) vakalarda FURACİN'in üzerine vazelinli gazlı bez konması pansumanın yapışmasını önler ve bu şekilde pansumanın 5-7 gün açılmadan bırakılması mümkün olur. Pansuman çıkarılırken gazlı bezin serum fizyolojikle ıslatılması, çıkarılmasını kolaylaştırır.

- **Değişik yaş grupları:**

**Çocuklarda kullanımı:**

FURACİN'in çocuklarda kullanımı ve miktarı doktorunuz tarafından belirlenmelidir.

**Yaşlılarda kullanımı:**

Yaşlılarda doz ayarlaması ile ilgili bir çalışma yapılmamıştır. FURACİN'in yaşlılarda kullanımı için herhangi bir kısıtlama yoktur.

- **Özel kullanım durumları:**

**Böbrek veya karaciğer yetmezliği:**

Böbrek yetmezliğiniz varsa bu durumu doktorunuza söylemelisiniz. Böbrek yetmezliği durumlarında kullanımında dikkatli olunuz. FURACİN'in bileşiminde bulunan polietilen glikol, derisi kalkmış vücut bölgelerinden emilerek böbrek bozukluğunuzu arttırabilir.

Karaciğer fonksiyon bozukluğu olan hastalarda doz ayarlaması bildirilmemiştir.

*Eğer FURACİN'in etkisinin çok güçlü veya zayıf olduğuna dair bir izleniminiz var ise, doktorunuz veya eczacınız ile konuşunuz.*

**Kullanmanız gerekenden daha fazla FURACİN kullandıysanız:**

*FURACİN'den kullanmanız gerekenden fazlasını kullanmışsanız, bir doktor veya eczacı ile konuşunuz.*

**FURACİN' i kullanmayı unutursanız,**

*Unutulan dozları dengelemek için çift doz uygulamayınız.*

Eğer FURACİN uygulamayı unutursanız, hatırladığınızda derhal uygulayınız. Ancak, gelecek uygulamaya yakın bir zamanda hatırlarsanız, kaçırdığınız uygulamayı yapmadan düzenli uygulama şeklinize devam ediniz.

#### **FURACİN ile tedavi sonlandırıldığındaki oluşabilecek etkiler**

Tedavinizi doktorunuza bildirmeden, kendi kendinize sonlandırmayınız.

#### **4. Olası yan etkiler nelerdir?**

Tüm diğer ilaçlar gibi, FURACİN'in içeriğinde bulunan maddelere duyarlı olan kişilerde yan etkiler olabilir.

**Aşağıdakilerden biri olursa, FURACİN'i kullanmayı durdurunuz ve DERHAL doktorunuza bildiriniz veya size en yakın hastanenin acil bölümüne başvurunuz:**

- Cilt döküntüsü, kaşıntı ve lokal ödem (şişlik) gibi değişik derecelerde kontakt dermatit (temasla ortaya çıkan deri hastalığı) reaksiyonları
- Deride süperenfeksiyon (nitrofurazon kullanımına bağlı mantar ve bazı mikroorganizmaların (Pseudomonas da dahil olmak üzere) çoğalması ile birlikte mevcut enfeksiyonun dışında yeni enfeksiyonlar)

Bunların hepsi çok ciddi yan etkilerdir.

Eğer bunlardan biri sizde mevcut ise, sizin FURACİN'e karşı ciddi alerjiniz var demektir. Acil tıbbi müdahaleye veya hastaneye yatırılmanıza gerek olabilir.

Bu çok ciddi yan etkilerin hepsi oldukça seyrek görülür.

*Eğer bu kullanma talimatında bahsi geçmeyen herhangi bir yan etki ile karşılaşırsanız doktorunuzu veya eczacınızı bilgilendiriniz.*

#### **Yan etkilerin raporlanması**

Kullanma Talimatında yer alan veya almayan herhangi bir yan etki meydana gelmesi durumunda hekiminiz, eczacınız veya hemşireniz ile konuşunuz. Ayrıca karşılaştığınız yan etkileri [www.titck.gov.tr](http://www.titck.gov.tr) sitesinde yer alan "İlaç yan Etki Bildirimi" ikonuna tıklayarak ya da 0 800 314 00 08 numaralı yan etki bildirim hattını arayarak Türkiye Farmakovijilans Merkezi (TÜFAM)'ne bildiriniz. Meydana gelen yan etkileri bildirerek kullanmakta olduğunuz ilacın güvenliliği hakkında daha fazla bilgi edinilmesine katkı sağlamış olacaksınız.

#### **5. FURACİN'in saklanması**

*FURACİN'i çocukların göremeyeceği, erişemeyeceği yerlerde ve ambalajında saklayınız.*

FURACİN'i 25°C altındaki oda sıcaklığında saklayınız.

Güneş ışığıyla, floresan ışığıyla, alkali maddelerle ve 40°C'den yüksek ısılarla doğrudan temasından kaçınılmalıdır.

#### **Son kullanma tarihiyle uyumlu olarak kullanınız.**

*Ambalajdaki son kullanma tarihinden sonra FURACİN'i kullanmayınız.*

Eđer üründe ve/veya ambalajında bozukluklar fark ederseniz FURACİN'i kullanmayınız.

Son kullanma tarihi geçmiş veya kullanılmayan ilaçları çöpe atmayınız! Çevre ve Şehircilik Bakanlığınca belirlenen toplama sistemine veriniz.

***Ruhsat sahibi:***

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Şişli-İstanbul  
Tel : (0212) 339 39 00  
Faks: (0212) 339 11 99

***Üretim yeri:***

Sanofi İlaç San. ve Tic. A.Ş.  
Lüleburgaz-Kırklareli  
Tel: (0 288) 427 10 00  
Faks: (0 288) 427 14 55

*Bu kullanma talimatı 19/07/2022 tarihinde onaylanmıştır.*